

## ИНСТРУКЦИЯ

### ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

#### Бальзам Золотая звезда

**Регистрационный номер:** П N013736/01

**Торговое наименование:** Бальзам Золотая звезда

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**  
Гвоздики цветков масло + Камфора + Коричника китайского коры  
масло + Мята перечной листьев масло + Эвкалипта листьев масло +  
[Левоментол]

**Лекарственная форма:** раствор для наружного применения

#### **Состав:**

на 100 мл препарата:

#### Действующие вещества:

Левоментол	28,000 г
Камфора рацемическая	8,880 г
Мята перечной листьев масло	22,900 г
Эвкалипта листьев масло	0,100 г
Гвоздики цветков масло	0,460 г
Коричника китайского коры масло	0,380 г

#### Вспомогательные вещества:

Ароматизатор Green mediol	0,700 г
Полиэтиленгликоль 400 (макрогол)	12,500 г
Пропиленгликоль	3,400 г
Сандалового дерева масло	0,020 г
Краситель коричневый Solvent Red 3	0.035г
Парафин жидкий	до 100 мл

## **Описание**

Прозрачная маслянистая жидкость коричневатого-красного цвета с характерным запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Местнораздражающее средство природного происхождения.

**Код АТХ:** Я05Х

## **Фармакологические свойства**

Препарат обладает местнораздражающим, отвлекающим и антисептическим действием.

## **Показания к применению**

В качестве симптоматического средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний (ОРЗ), гриппа, головной боли, головокружения, ринита (насморка), укусов насекомых.

## **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Повреждения кожных покровов, наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого применения препарата (пиодермия, дерматит, экзема). Эпилепсия, склонность к судорогам, спазмофилия, бронхиальная астма, коклюш.

Детский возраст до 2-х лет.

## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин применение препарата в период беременности и во время кормления грудью не рекомендуется.

## **Способ применения и дозы**

Наружно. Препарат наносят тонким слоем на болезненные участки кожи и втирают: при головной боли - в височную или затылочную область; при рините (насморке) - крылья носа; при простудных заболеваниях – растирают область спины и грудь. При укусах насекомых бальзам жидкий наносят на место укуса.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения, которые указаны в инструкции по применению.

## **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, при появлении которых применение препарата должно быть прекращено. Остатки бальзама необходимо удалить при помощи влажных салфеток и промыть обильным количеством воды.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

## **Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки отмечено не было.

При случайном приеме препарата внутрь симптомы передозировки включают желудочно-кишечные (тошнота, рвота, диарея, боли в животе) и неврологические расстройства (головная боль, головокружение, ощущение жара/«приливы», судороги, угнетение дыхания и кома).

Лечение симптоматическое. Не следует вызывать рвоту из-за риска, связанного с последующей ингаляцией камфоры и развитием ларингоспазма

у детей младшего возраста, который может привести к летальному исходу. В случае приема бальзама внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не изучалось.

### **Особые указания**

Следует избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки носа и полости рта, а также на поврежденные участки кожи.

Из-за риска фотосенсибилизации после нанесения препарата следует избегать пребывания на солнце.

В случае попадания препарата на слизистые оболочки следует удалить препарат при помощи влажных салфеток и промыть обильным количеством воды.

Не рекомендуется применять препарат в детском возрасте без консультации врача.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Раствор для наружного применения.

По 5 мл во флакон из прозрачного стекла с навинчивающимся пластиковым колпачком. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 30°C.  
Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности** 5 лет.

Не использовать по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ДАНАФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНИ д.253, ул. Зунг  
Си Тхань Тхе, р-он Тхань Тхе, г. Дананг, Вьетнам

**Уполномоченная организация в РФ по принятию претензий от потребителей:**

ЗАО "Доминанта-Сервис", 142100, Московская область, г. Подольск, ул.  
Комсомольская, д. 1, тел/факс: +7-495-580-30-60.